

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Передозировка. Никогда самостоятельно не повышайте дозу анальгетика, назначенную врачом. Передозировка опиоидного анальгетика может вызвать нарушение дыхания.

Отмена. Резко прекращать приём опиоидов нельзя, это может привести к ухудшению общего самочувствия. Доктор поможет Вам постепенно снизить дозу препарата, чтобы избежать неприятных симптомов.

Алкоголь. Употребление алкоголя на фоне приёма опиоидных препаратов может вызвать осложнения. Проконсультируйтесь с врачом о возможности сочетания Вашего обезболивающего с алкоголем. Также без консультации врача нельзя вместе с опиоидными анальгетиками принимать транквилизаторы, антигистаминные и другие препараты, обладающие снотворным действием.

Хранение. Опиоидные препараты необходимо хранить в местах, недоступных для детей. Нельзя также допускать передачи лекарств другим людям. Лекарство, принимаемое без врачебного назначения, может оказаться очень опасным, особенно для детей.

ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ВЫЗЫВАЮТ ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ЕСЛИ ОНИ НАЗНАЧЕНЫ ВРАЧОМ И ПРИМЕНЯЮТСЯ КОРРЕКТНО. ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО У ВАС РАЗВИВАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ВРАЧУ.

КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ НА СИЛЬНЫЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

1. Если пациент наблюдается амбулаторно по месту жительства

- В случае выраженного болевого синдрома пациент или его законный представитель может без предварительной записи попасть на прием к лечащему врачу (сначала к онкологу, который назначит препарат, а затем к терапевту, который выпишет рецепт) в лечебное учреждение (поликлинику / онкодиспансер) для получения рецепта.

- После получения рецепта следует обратиться в аптеку по месту регистрации, куда лечебное учреждение подает списки пациентов, которым назначены сильнодействующие препараты (по рецепту).

! С рецептом можно обратиться только в определенную аптеку, ее адрес нужно уточнить у лечащего врача.

2. Если пациент выписывается из стационара лечебного учреждения/хосписа

- В отдельных случаях по решению администрации можно получить некоторые препараты на руки при выписке из стационара (не более чем пятидневную дозу согласно назначению врача).

Что нужно знать о Хроническом Болевом Синдроме

(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ)

